

Diverticulitis aguda perforada con absceso en músculo ileopsoas

Ileopsoas abscess as an outbreak of an acute complicated diverticulitis

Marta Vicente López¹

La diverticulitis aguda resulta de una patología muy común valorada en urgencias hospitalarias¹. Los abscesos a nivel del músculo psoas-iliaco presentan etiologías de distinta estirpe², siendo infrecuente su origen a raíz de una diverticulitis aguda.

Se presenta el caso de una mujer de 86 años, que consulta en urgencias por impotencia funcional de miembro inferior izquierdo. A la exploración, presenta rotación interna del mismo y movilización pasiva dolorosa, resultado la exploración abdominal anodina. Tras descartar patología traumática, se amplía el estudio con analítica, presentando aumento de reactantes de fase aguda; y TC abdomino-pélvica (Figura 1), evidenciándose una diverticulitis aguda perforada y colecciones en el espesor del músculo ileopsoas. Se realiza una sigmoidectomía, colostomía terminal y drenaje transglúteo del absceso de ileopsoas. En el postoperatorio, presenta fallo multiorgánico, siendo éxitus a las 24 horas de la cirugía.



Figura 1. Corte coronal de tomografía computada de abdomen y pelvis con contraste ev.

¹Hospital Marina Baixa, La Vila Joiosa, Alicante, España.

Recibido el 2023-07-10 y aceptado para publicación el 2023-07-18.

Correspondencia a:
Dra. Marta Vicente López
martavilo95@gmail.com

E-ISSN 2452-4549



Bibliografía

- Swanson SM, Strate LL. Acute Colonic Diverticulitis. *Ann Intern Med.* 2018;168:ITC65-ITC80. doi: 10.7326/ AITC201805010. Erratum in: *Ann Intern Med.* 2020;172:640. PMID: 29710265.
- García-Morán A, Campoamor-Serrano MT, de la Fuente-García B, Viejo-Guerra G, Fernández-Regueiro R. Absceso de psoas secundario a diverticulitis aguda perforada [Psoas abscess secondary to perforated acute diverticulitis]. *Semergen* 2017;43:407-9. Spanish. doi: 10.1016/j.semerg.2016.11.008. Epub 2017 Apr 20. PMID: 28434808.