

Absceso perianal y fístula como forma de presentación infrecuente de un hamartoma quístico retrorrectal en la adolescencia

Perianal abscess and fistula as an unusual form of presentation of a retrorrectal cystic hamartoma in adolescence

Jesús Lucendo Ramírez¹, Pablo Sancho Pardo¹, Iván Leal García¹

El hamartoma quístico retrorrectal se trata de una entidad infrecuente, de origen congénito y más habitual en mujeres de entre 40 y 60 años¹.

Puede provocar síntomas crónicos e inespecíficos como sensación de ocupación, alteración del tránsito intestinal o dolor sordo. Sin embargo, en su mayoría cursa de forma indolente, siendo por lo tanto diagnosticado de forma accidental en pruebas de imagen solicitadas por otro motivo.

Presentamos el caso de un paciente de 17 años con un hamartoma quístico retrorrectal que debutó en forma de absceso perianal. Tras el drenaje urgente del absceso, persistía con supuración residual en el posoperatorio, por lo que se solicitó una Resonancia Magnética (RM) pélvica que evidenció dicha formación retrorrectal con un tamaño de 13 mm.

No se recomienda la biopsia preoperatoria dada la diseminación tumoral que esta podría suponer a lo largo del recorrido de la punción, y su tratamiento es siempre quirúrgico, optando por un acceso abdominal o perineal según la localización de la lesión¹.

Dado el riesgo de malignización existente y la clínica inespecífica que suele acompañar a esta patología, resulta fundamental la sospecha precoz para evitar demoras en el diagnóstico y manejo que pudieran influir en el pronóstico de los pacientes.

Rol

Todos los autores participaron en todas las etapas de elaboración del manuscrito.




Figura 1. Corte de RM que muestra un hamartoma quístico retrorrectal de 13 mm.

¹Hospital Marina Baixa
Villajoyosa, Alicante, España.

Recibido el 2024-12-23 y
aceptado para publicación el
2024-12-30

Correspondencia a:
Lucendo Ramírez
jesuslucen@gmail.com

E-ISSN 2452-4549



Bibliografía

1. Ostiz M, Yanguas N, Jiménez G, González G, Fernández de los Reyes I. Hamartoma quístico retrorrectal (tailgut cyst): una causa infrecuente de dolor abdominal recurrente. *An Sist Sanit Navar*. agosto de 2017;40(2):303-7.